

～口角挙上について～

記載された内容は一般的なもので個人差がございます

・口角挙上とは
下がった口角を引き上げる方法です。

口元の表情は口角挙筋、大頬骨筋、口角下制筋の3つの筋肉によって作り出されています。口角挙上術では、これらの筋肉を手術することにより、口角を持ち上げることができます。

生まれつき口角を下がっている方、加齢により徐々に下がってきた方のどちらにも対応可能です。切開することに抵抗がある場合はボトックス注射によって一時的に口角を上げることができます。

【価格】

口角挙上	(通常) 200,000 円	(モニター) 180,000 円
オプション 笑気麻酔：10,000 円		

【リスク】

発赤、腫れ、痛み、つっぱり感、熱感、硬結、違和感、異物感、ケロイド、色素沈着
完全な左右対称にはならない可能性、一時的な口の動かしにくさなどを生じる事がございます。

稀にアレルギー、感染、痺れ、倦怠感、頭痛、筋肉痛、蕁麻疹、痒み、むくみ、発熱、咳
冷や汗、胸痛、アナフィラキシーショック、呼吸困難などを生じる事がございます。
※万が一このような症状が生じた際はお早めに受診をお願い致します。

【アフターケア】

傷口の糸は1週間後に抜糸致します。
浮腫みや腫れ、傷の治りの遅れとなる為、喫煙や血行がよくなる事、
(エステやサウナ、激しいスポーツ、大量の飲酒等)は1週間控えて下さい。
洗顔は翌日から患部に触れないようにでしたら可能です。
シャワーは首から下のみ当日から可能です。
洗髪は患部に触れないようお気をつけ下さい。入浴は1週間後から可能です。
メイクは患部以外でしたら施術直後から可能です。口紅は抜糸後までお控え下さい。
頭を高くして寝ると浮腫みを抑えられます。
術後1～2週間は熱いものや辛いものなど、刺激の強い食べ物は避けて下さい。